

Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Biverkningsrapporter

Till Läkemedelsverket inkommer biverkningsrapporter från den svenska hälso- och sjukvården samt från konsumenter och patienter. Rapporterna registreras i den svenska databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar.

För att underlätta tolkningen av statistik och uppgifter från databasen, har nedanstående information sammanställts.

Varför behövs biverkningsrapporter?

Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga eller sällsynta biverkningar är oftast mer begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför viktig vid övervakning av riskprofilen hos läkemedel när de sen används av en större grupp patienter.

Vad ska rapporteras?

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård dvs. sjukvårdshuvudmannen (i praktiken anställda läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter) ska rapportera alla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. *Det är särskilt viktigt att allvarliga och/eller okända biverkningar rapporteras.* Biverkningsdefinitionen har sedan juli 2012 breddats och omfattar nu samtliga negativa effekter av läkemedel inkluderande även biverkningar vid användning utanför godkänd indikation.

Vad är en allvarlig biverkning?

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Hur görs en sambandsbedömning av biverkningsrapporter?

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att rapportera redan vid *misstanke* om en läkemedelsbiverkning. Det innebär att den som rapporterar in biverkningen inte behöver ha fastställt ett samband mellan läkemedlet och händelsen.

I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet bekräftas först efter analys av flera liknande rapporter samt med stöd från den samlade vetenskapen, där alla rapporter om misstänkta biverkningar är ett viktigt tillskott till det större pusslet. Sambandsbedömning kommer att göras i det samlade underlaget vid detektion och utredning av en potentiell säkerhetsrisk. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid denna bedömning är bland annat patientens sjukdom, samtidigt intag av andra läkemedel, tidsförlopp för intaget och händelsen samt möjlig mekanism

Hur ska uppgifterna från databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar tolkas?

Biverkningsrapporteringen ska ses som en viktig pusselbit av flera i ett sammanhang där läkemedelssäkerheten övervakas av Läkemedelsverket. Rapporteringen är ett redskap för att identifiera signaler om misstänkta säkerhetsproblem med läkemedel.

För Läkemedelsverket
Veronica Arthurson
Enhetschef, Enheten för läkemedelssäkerhet

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

Antal handlagda rapporter	Totalt
Comirnaty	1,216

Rapportör / allvarlig eller icke allvarlig	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Hälso och Sjukvård	222	355	577
Konsument	562	77	639
Antal rapporter	784	432	1,216

Rapporter per åldersgrupp/kön	Kvinna	Man	Okänt	Totalt
10-19 år	6	2		8
20-29 år	98	18		116
30-39 år	183	24		207
40-49 år	199	31		230
50-59 år	219	25	1	245
60-69 år	83	13		96
70-79 år	46	27		73
80-89 år	87	37		124
90+	65	30		95
okänt	20	2		22
Antal rapporter	1,006	209	1	1,216

I tabellen visas antal rapporter med dödsfall och åldersgrupper för de avlidna

Åldersfördelning	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90+	Totalt
Antal rapporter med dödsfall	1	1	3	18	30	26	79

Rapporter från hälso- och sjukvården, regioner (konsumentrapporter ej medräknade)	Antal rapporter
0 Länsuppgift saknas	27
AB Stockholm	98
AC Västerbotten	9
BD Norrbotten	11
C Uppsala	24
D Södermanland	17
E Östergötland	20
F Jönköping	19
G Kronoberg	20
H Kalmar	16
I Gotland	5
K Blekinge	2
M Skåne	79
N Halland	8
O Västra götaland	82
S Värmland	15
T Örebro	15
U Västmanland	9
W Dalarna	23
X Gävleborg	21

Datauttag utfört 2021-03-03


Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Rapporter från hälso- och sjukvården, regioner (konsumentrapporter ej medräknade)	Antal rapporter
Y Västernorrland	26
Z Jämtland	11
Antal rapporter	557

Datauttag utfört 2021-03-03

Handlagda rapporter

Diagrammet visar fördelningen av handlagda rapporter om misstänkta biverkningar per systemorganklass. Värt att notera är att en rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar.



Tabellen visar de systemorganklasser med flest rapporterade misstänkta biverkningar. Under respektive systemorganklass visas de tre vanligaste misstänkta biverkningarna om fler än tio

Systemorganklass exempel på rapporterade misstänkta biverkningar	Antal rapporter
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället feber, trötthet, smärta vid vaccinationsstället	756
Centrala och perifera nervsystemet huvudvärk, yrsel, domningar	493
Muskuloskeletala systemet och bindväv smärta i extremitet (ont i vaccinerad arm), muskelvärk, ledvärk	332
Magtarmkanalen illamående, kräkning, diarré	238
Andningsvägar, bröstorg och mediastinum tungt att andas, hosta, halsont	159
Hud och subkutan vävnad urtikaria, klåda, rodnad	140
Hjärtat hjärklappning, takykardi	59
Immunsystemet allergisk reaktion, anafylaktisk reaktion	49
Infektioner och infestationer -	48
Undersökningar ökad puls	48